

<p>عارضه جانبی مهم :</p> <p>Hydralazine</p> <p>مصرف مقادیر بالای این داروی ضد فشار خون می تواند منجر به عارضه شبه لوپوس با آسیب عضلات، مفاصل و پوست همراه باشد که با قطع مصرف دارو بهبود می یابد .</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>مورد مصرف دارو :</p> <p>Yohimbine</p> <p>علاوه بر بهبود مشکلات ارکتایل در مردان، برای درمان کاهش فشار خون وضعیتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>موارد مصرف دارو :</p> <p>Captopril,Enalapril,Lisinopril</p> <p>این داروها علاوه بر درمان پر فشاری خون، برای بیماران پس از سکته قلبی و نارسایی قلبی نیز تجویز می شود.درضمن احتمال ابتلا به دیابت را نیز در این کاهش بیماران کاهش می دهد.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>موارد مصرف دارو :</p> <p>Captopril,Enalapril,Lisinopril</p> <p>این داروهای قلبی - عروقی برای کاهش پروتئین اوری ناشی از بیماری های مزمن کلیوی به خصوص در افراد دیابتی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>نکته مهم :</p> <p>Captopril,Enalapril,Lisinopril</p> <p>نسبت به سایر داروهای ضد فشار خون، مصرف همزمان دیورتیک ها با این داروها می تواند منجر به کاهش بیشتر فشار خون شود.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>تداخل دارویی شایع :</p> <p>Captopril,Enalapril,Lisinopril</p> <p>علاوه بر مکمل های حاوی پتاسیم و بعضی دیورتیک ها، مصرف همزمان این داروها با ضد التهاب های غیر استروئیدی و بتا بلوکر ها نیز می تواند منجر به عوارضی چون : ضعف عضلانی، بی نظمی ضربان و تپش قلب شود.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>خطر مصرف در بارداری :</p> <p>Captopril,Enalapril,Lisinopril</p> <p>هنگام تجویز این داروها برای خانم ها حتما از باردار نبودن بیمار اطمینان حاصل کنیم !</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>هشدار مهم :</p> <p>Verapamil,Diltiazem</p> <p>مصرف همزمان این داروها با بتابلوکرها می تواند در افراد مستعد منجر به بلوک قلبی شود.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>

موارد مصرف دارو :

Milrinone

این داروی تزریقی، برای درمان کوتاه مدت نارسایی پیشرفته قلبی مورد تجویز قرار می گیرد، با این امتیاز که برون ده قلبی بیش از داروی مشابه نیتروپروساید افزایش می یابد.
خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

نکته مهم:

Guaifenesin

این داروی اکسپکتورانت کم عارضه است، اما مصرف شب هنگام آن برای کودکان می تواند منجر به تجمع خلط رقیق در مجاری تنفسی و آزردهگی بیمار شود .

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

تداخل غذا - دارو:

Captopril, Enalapril, Lisinopril

مصرف مقادیر زیاد فلفل قرمز با این داروها، اثر بخشی آنها را در کاهش فشارخون کم کرده و عارضه سرفه خشک را افزایش می دهد .

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:

Acetaminophen

عوارض کبدی مصرف طولانی مقادیر بالای این دارو، با مصرف گیاه خار مریم یا داروی سیلیمارین کاهش می باید .

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:

Fluoxetine, Citalopram, Sertraline, Fluvoxamine

مصرف داروی تقویت کننده حافظه جینکو با این داروها، عارضه کاهش میل جنسی این داروها را کاهش می دهد .

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

<p>تداخل گیاه دارویی با دارو:</p> <p>Corticosteroids</p> <p>مصرف گیاه ضد التهاب شیرین بیان با کورتون ها باعث افزایش عوارضی چون: احتباس مایعات، افزایش وزن و فشارخون بیماران می شود .</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>اثر سودمند غذا بر دارو:</p> <p>Aspirin</p> <p>مصرف فلفل قرمز و شیرین بیان قبل از این دارو، از عوارض گوارشی آن می کاهد .</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:</p> <p>Cisplatin</p> <p>گیاه دارویی خارمریم یا سیلیمارین حاصل از آن، اثرات سمی این داروی شیمی درمانی را روی کلیه کاهش می دهد.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:</p> <p>Ciclosporin</p> <p>گیاه دارویی خارمریم یا سیلیمارین حاصل از آن، اثرات سمی این داروی مانع دفع پیوند را روی کلیه و لوزالمعده کاهش می دهد. اما توجه داشته باشیم که عارضه بالا رفتن قند خون آن را افزایش می دهد.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>اثر سودمند مصرف گیاه دارویی با دارو:</p> <p>Haloperidol, Metronidazole</p> <p>گیاه دارویی خارمریم یا سیلیمارین حاصل از آن، عوارض کبدی این داروها را کاهش می دهد.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>نکته مهم:</p> <p>Atorvastatin, Pravastatin, Simvastatin, Lovastatin</p> <p>به دلیل احتمال بروز آسیب کبدی، سطح آمینوترانسفراز های خون باید یک تا دو ماه پس آغاز درمان با این داروها سنجیده شود و در صورت عدم تغییر، هر ۶ تا ۱۲ ماه این آزمایش تکرار گردد.</p> <p>خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران</p>
<p>تذکر بسیار مهم:</p> <p>Atorvastatin, Pravastatin, Simvastatin, Lovastatin</p> <p>با مصرف این داروها در صورت بروز عوارضی چون درد و ضعف عضلانی، باید سطح کراتین کیناز خون بیمار اندازه گیری شود و در صورت بالا بودن، بلافاصله مصرف دارو قطع گردد. معمولا میوپاتی، با قطع مصرف دارو بهبود می یابد.</p>

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

تداخل دارویی مهم:

Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin #Erythromycin, Clarithromycin

باعث افزایش غلظت استاتین ها می شود و با عوارضی چون آسیب کبدی (زردی پوست و چشم)، تخریب بافت عضلانی و نهایتاً آسیب کلیوی (درد عضلانی، راش پوستی، تب و تیرگی ادرار)، و حتی مرگ همراه است. پراواستاتین با این آنتی بیوتیک ها تداخل ندارد.

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

یادآوری مهم:

Atorvastatin, Pravastatin, Simvastatin, Lovastatin

فراموش نکنیم که مصرف این این داروها برای خانم های شیرده، باردار یا آنهایی که تصمیم به بارداری دارند، ممنوع است. ضمناً مصرف این داروها باید در شرایط بیماری های سخت، ضربات شدید و جراحی ها موقتا قطع شود.

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

نکته مهم:

Pravastatin, Simvastatin, Lovastatin

به دلیل اینکه بیوسنتز کلسترول در کبد شب هنگام انجام می شود، لذا بهتر است تک دوز این داروها عصر ها مورد استفاده قرار گیرد. البته آتورواستاتین از بین داروهای استاتین از این نظر استثنا است.

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

نکته مهم:

Atorvastatin, Simvastatin, Lovastatin

جذب این داروها اگر به همراه غذا مصرف شوند، افزایش می یابد. البته غذا روی جذب پراواستاتین تاثیری ندارد.

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

تذکر مهم:

Atorvastatin, Pravastatin, Simvastatin, Lovastatin

به بیماران مصرف کننده این داروها یادآوری کنیم که معمولاً گلوکز ناشتای خون در اثر مصرف این داروها، به میزان ۵ تا ۷ میلی گرم بر دسی لیتر افزایش می یابد.

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

چرا استاتین ها از بین داروهای ضد چربی خون، برای درمان بیماری های قلبی-عروقی بیشتر مورد توجه هستند؟ چون علاوه بر تاثیر مثبت روی پروفایل چربی های خون به خصوص کاهش ال دی ال، باعث بهبود عملکرد اندوتلیال عروق، کاهش تجمع پلاکتی، تحریک رگ زایی در بافت ایسکمیک قلب و تثبیت پلاک عروقی می شوند.

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

آیا استاتین ها علاوه بر درمان بیماری های قلبی-عروقی موارد مصرف دیگری هم دارند؟ این داروها برای درمان آلزایمر و پیشگیری از سرطان پروستات هم تجویز می شوند. اما این اندیکاسیون ها هنوز به اثبات نرسیده است.

خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

Glibenclamide, Gliclazide

موقع تحویل این داروی ضد دیابت، حتما از بیمار در مورد بارداری، شیردهی، دیابت نوع یک و نارسایی شدید کبدی یا کلیوی سوال کنیم، چون در این بیماران منع مصرف دارد!
خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

Glibenclamide, Gliclazide

چرا این دارو برای دیابت نوع یک کارایی ندارد؟ چون این دارو به سلول های بتا پانکراس فعال نیاز دارد تا ترشح آنها را افزایش دهد. دیابتی های نوع یک و نوع دو پیشرفته این سلول ها را از دست داده اند!
خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران

Glibenclamide, Gliclazide

به بیماران یادآوری کنیم که این داروها بر خلاف مت فورمین، اشتها را افزایش داده و وزن را ۱ تا ۳ کیلوگرم افزایش می دهد.
خودآموز پیام کوتاه انجمن داروسازان ایران